

Reservemedikamente			
Medikament	Dosierung	Frequenz	zusätzliche Info
<b>Schmerzen</b>			
<i>opioidnaive Patienten</i>			
<input type="checkbox"/> Morphin Lös. 2%	3-5 Trpf. p.o.	stdl	wenig Flüssigkeit; 1 Trpf = 1mg
<input type="checkbox"/> Morphin Amp 10 mg/ml	1-2 mg s.c.	stdl	<b>Verd: 1 Amp Mo + 9 ml NaCl 0,9% = 10mg Mo/10 ml</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<i>Patienten unter Opiattherapie</i>	10% der bish. Tagesdosis		iv halbe Dosis
<input type="checkbox"/>			Umrechnung Mo - Fentanyl
<input type="checkbox"/>			Mo sc-Fentanyl Pflaster 1.5 : 1.0
			Mo iv-Fentanyl Pflaster 1.0 : 1.0
			Mo po-Fentanyl Pflaster 3.0 : 1.0
<b>Angst</b>			
<input type="checkbox"/> Temesta Exp 1.0 mg	1 Tbl.	6x/24h	sek. Ursache ausschliessen / Medis überprüfen
<input type="checkbox"/>			
<b>Unruhe</b>			
<input type="checkbox"/> Haldol Trpf 2 mg/ml	10 Trpf	6 x /24h	10 Trpf=1mg, in wenig Flüssigkeit
<input type="checkbox"/> Haldol Amp 5mg/ml	1mg s.c.	6 x/ 24h	1ml nach Verd. (1 Amp Haldol + 4 ml NaCl 0,9% = 5mg Haldol/5ml) ev. Spritzenpumpe
<input type="checkbox"/> Dormicum Amp 5 mg/5ml	1 mg sc oder iv	stdl	1mg=1ml
<input type="checkbox"/> Dormicum Amp 5 mg/1ml			evtl Spritzenpumpe
<input type="checkbox"/>			
<b>Terminales Rasseln</b>			
<input type="checkbox"/> Buscopan Amp 20 mg/ml	20 mg s.c.	6x/24h	Flüssigkeitsmenge überprüfen (<500 ml?)
<input type="checkbox"/>			ev Spritzenpumpe + 3x Reserve
<b>Übelkeit/Erbrechen</b>			
<input type="checkbox"/> Motilium lingual	1 Tbl.	6x / 24h	Check Medi, Leber-/Niereninsuffizienz,
<input type="checkbox"/> Paspertin Amp 10 mg/2ml	10 mg s.c.	6x / 24h	Motilitätshemmung bei Peritonealkarzinose
ev. Spritzenpumpe mit 6 Amp			
Opiat-induziert:			
<input type="checkbox"/> Haldol Trpf 2 mg/ml	10 Trpf	6x / 24h	10 Trpf= 1mg, mit wenig Flüssigkeit
<input type="checkbox"/>			Prophylaxe bei Mo-Gabe 3x3 Tr
<b>Epileptische Anfälle</b>			
<input type="checkbox"/> Temesta Exp. 1.0 mg	1-3 Tbl	3x / 24h	ev kausale Therapie mit
<input type="checkbox"/> Stesolid Rektiole 10 mg	1 anal	10 Min. 3x	Dexamethason 16 mg sc/Keppra 2x500 mg sc
<input type="checkbox"/> Dormicum Amp 5 mg/5ml	1 mg sc oder iv	alle 20 Min	Erhaltungstherapie 1 mg/Std über Spritzenpumpe
<b>Dyspnoe</b>			
<i>opioidnaive Patienten</i>			
<input type="checkbox"/> Morphin Lösung 2%	3-5 Trpf p.o	alle 20 Min	1 Trpf =1mg
<input type="checkbox"/> Morphin Amp.10 mg/ml	2.5 -5 mg s.c.	alle 20 Min	20 Minuten bezieht sich auf Akutsituation
<input type="checkbox"/> Dormicum Amp 5 mg/5ml	2.5-5 mg s.c.	alle 20 Min	1-2.5ml
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<i>Patienten unter Opiattherapie</i>			
<input type="checkbox"/> Morphin Amp 10 mg/ml	_____	alle 20 Min	15% der Tagesdosis
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Datum:

Unterschrift: