

Palliative Reservemedikation[©]

Die aktuelle Medikation wurde geprüft und unnötige Medikamente abgesetzt: Ja Nein

Aktuelle Medikamentenliste im Anhang: Ja Nein

Name Patient*in: _____

Visum / Dat. Arzt*	Reservemedikation in der Palliativsituation				Stop/ Visum Arzt
	Schmerz	Übliche Dosierung	Innerhalb von 24 Stunden	Anmerkung / andere Dosierung	
	Morphin Lösung 20mg / ml (1 Tropfen = 1 mg)	2-5 Trpf.	bis 1 stündlich		
	Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)	1-2.5 mg sc	bis 1 stündlich		
	Mind. 1/10 der bisherigen Tagesdosis bei Vorbehandlung mit Opiaten (cave Nauseaprophylaxe)		X		
	anderes				
	Angst				
	Temesta Exp 1.0 mg	0.5 - 1 mg	bis 1 stündlich bis max. 8 mg/d		
	Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	0.5 - 1 mg sc	bis max. 1 stündlich		
	anderes				
	Unruhe und/oder Delir				
	Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)	3-5 Trpf.	bis 1 stündlich bis max. 10 mg/d		
	Haldol Amp. (5 mg / 1 ml)	0.5 - 1 mg sc	bis 1 stündlich bis max. 10 mg/d		
	Bei massiver Unruhe, Agitiertheit 3 Dosen Haldol, dann 1 Dosis Benzodiazepine (Temesta od. Dormicum)				
	anderes				
	Atemnot				
	Morphin Lösung 20mg / ml (1 Tropfen = 1 mg)	2-5 Trpf.	bis alle 20 Min.		
	Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)	1-2.5 mg sc	bis alle 20 Min.		
	Temesta Exp 1.0 mg	1 mg	bis 1 stündlich bis max. 8 mg/d		
	Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	1 mg sc	nach 20 Min. wiederholbar, max. 4x		
	anderes				

Visum / Dat. Arzt*		Übliche Dosierung	Innerhalb von 24 Stunden	Anmerkung / andere Dosierung	Stop / Visum Arzt
	Rasselatmung				
	Buscopan Amp. (20 mg / 1 ml)	20 mg sc	bis max. 120 mg/d		
	anderes				
	Übelkeit / Erbrechen				
	Motilium lingual 10 mg	1 Tbl.	bis max. 30 mg/d		
	Paspertin Trpf. (30 Trpf. = 10 mg)	30 Trpf.	bis max. 30 mg/d		
	Paspertin Amp. (10 mg / 2 ml)	10 mg sc	bis max. 30 mg/d		
	Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)	3–5 Trpf.	bis max. 10 mg/d		
	Haldol Amp. (5 mg / 1 ml)	0.5 mg sc	bis max. 10 mg/d		
	anderes				
	Störende Obstipation				
	Magnesia san Pellegrino	0.5-2 ml	morgens		
	Laxoberon	3-20 Trpf.	abends		
	Bulboid /Mikroclist	Supp/Clistier	Nach Bedarf	Cave: TC-Penie <20	
	Epileptische Anfälle / Status epilepticus				
	Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	2 mg sc	nach 15 Min. wieder- holbar, max. 2x		
	anderes				
	Individuelle Symptome: z.B. Juckreiz, Blutungssymptome				
	anderes				

Diese Verordnung gilt für alle hier aufgeführten Medikamente inkl. Dosierung (einzelne Medikamente streichen möglich)	
Datum	Unterschrift Arzt*in

Erreichbarkeit mit Arzt*in ist abgeklärt?	Ja Nein	Mobile-Nr.
Datum	Unterschrift Arzt*in	

* Ein neuer Plan kann unter: www.palliative-ostschweiz.ch heruntergeladen werden.

Herausgeber:

palliative ostschweiz, Geschäftsstelle, benevolpark, St. Leonhard-Strasse 45, CH-9000 St. Gallen, T 071 245 80 80
www.palliative-ostschweiz.ch, info@palliative-ostschweiz.ch

In Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe von Fachpersonen unter *palliative ostschweiz*

Urheberrecht:

Grundsätzliche Änderungen im Dokument «Palliative Reservemedikation®» nur nach Rücksprache mit *palliative ostschweiz* möglich.